



PANCRÉATITE AIGUE DANS UN HÔPITAL DE RÉFÉRENCE: A PROPOS DE 15 CAS

Dr Winnie Bekolo Nga

Hépatogastroentérologue - oncologue digestif

Assistante Faculté de Médecine – Université de Douala

Plan

- Introduction
- But de l'étude
- Méthodologie
- Résultats et Discussion
- Conclusion

Introduction

- Affection grave
- Etiologies : Alcool, lithiase biliaire
- Incidence:
 - Europe: 4,6 – 100 cas/100 000 habitants ⁽¹⁾
 - Afrique: Afrique du Sud 1% des admissions en chirurgie ⁽²⁾
- faibles données épidémiologiques

(1) *Roberts et al. Pancreatology 2017*

(2) *Anderson et al. SAJS 2008.*

But de l'étude

- Décrire les caractéristiques cliniques et paracliniques des patients ayant un pancréatite aigue dans un hôpital de référence au Cameroun

Méthodologie

- Type d'étude: transversale descriptive
- Lieu: Hôpital Général de Douala
- Période: 1^{er} Janvier 2013 au 31 Juillet 2019
- Inclusion: dossiers des patients hospitalisés pour pancréatite aigue
- Exclusion: dossiers incomplets ou perdus

Méthodologie

- Données recueillies:
 - Données sociodémographiques (âge, sexe, région d'origine)
 - Données cliniques (antécédents, présentation clinique, délai de consultation, durée d'hospitalisation)
 - Données paracliniques: biologie et imagerie
- Analyse statistique: logiciel Epi Info 7

Résultats et Discussion

18 dossiers colligés

15 dossiers inclus

3 dossiers exclus (incomplets)

Incidence: 2,3 cas par an

Résultats et Discussion

Tableau I: Caractéristiques sociodémographiques de la population étudiée

Variables	Valeur (%)
Age moyen	44,6±16,68 ans
Sexe masculin	9 (60)
Origine Ouest Cameroun	7 (46,7)
Consommation d'alcool	9 (60)

Résultats et Discussion

- Délai de consultation: $18,6 \pm 25$ jours
- Durée d'hospitalisation: $8,5 \pm 5,8$ jours

Résultats et Discussion

Tableau II: Présentation clinique

Signes cliniques	Effectifs (%)
Douleur épigastrique	15 (100)
Altération de l'état général	10 (66,67)
Fièvre	05 (33,33)
IMC > 30	05 (33,33)
Ictère	01 (6,67)
Altération de la conscience	01 (6,67)

Résultats et Discussion

Tableau III: Aspects biologiques de la population étudiée

Variables	Valeurs (%)
Lipasémie	462±889,9UI/l
CRP	154,12±125,78mg/l
Leucocytes > 10 000/mm ³	7 (46,67)

Résultats et Discussion





Figure 1: Aspects radiologiques de la population étudiée

Résultats et discussion

Etiologies de la Pancrétatite aigue



Résultats et Discussion

- Traitement
 - Mise au repos de la glande $2,66 \pm 2,05$ jours
 - Traitement antalgiques de 2^{ème} palier
- Evolution:
 - Complications: **pseudo-kystes 26,67% (n=4)**

Conclusion

- Pathologie grave
- Retard diagnostique lié au délai de consultation
- Pas corrélation entre la clinique et l'imagerie
- Evolution favorable